



Grandes
Cultures

Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 5 du 28/03/96



COLZA

Méligèthes : → Intervenez en fonction du dernier traitement

BLE

→ Si Risque Piétin : Intervenez avant le stade 2 noeuds

ORGE

→ Maladies : Intervenez dès le stade 1 noeud

TOURNESOL

→ Choisir vos variétés / Mildiou-Phomopsis

COLZA

Stades : Boutons accolés cachés (D1), visibles (D2), séparés (E) ponctuellement

MELIGETHES

Forte pression au cours de ce week-end et de ce début de semaine ensoleillé dans la majorité des postes de piégeages.

Examiner attentivement vos cuvettes et boutons floraux.

Intervenir en tenant compte de la date de votre traitement «Charançon de la tige» (délai supérieur à 15 jours).

CHARANÇONS DE LA TIGE

Activité plus réduite dorénavant. Pic de vol vers le 20/03.

Fin du risque dès le stade «tige 20cm».

Captures enregistrées depuis le 20/03/96

	Charançons de la Tige (napi)	Pic de vol du Charançon	Méligèthes
Pérignat (63)	9	11/03	1
Joze (63)	17	18/03	133
Maringues (63)	6	21/03	87
Artonne (63)	0	09/03	26
St-Géron (43)	23	22/03	66
Charmes (03)	10	26/03	10
St-Pourçain/B (03)	1	-	50
Treteau (03)	0	-	50
Loriges (03)	23	23/03	130
Le Theil (03)	2	-	50

Publication mensuelle
Abonnement annuel : 275 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70



4^e 10
47210 03

79

BLE d'Hiver

**Stades : Redressement 4 à 5, Epi 1cm,
1 noeud (6) semis très précoces**

● Rhizoctone fréquent.

● **Piétin-Verse** : symptômes encore peu importants (moins de 10% de pieds touchés). Présent surtout sur les semis de début Octobre, et dans les secteurs à risque de l'Allier, et parcelle par parcelle.

Le risque Piétin amorce une remontée depuis 1995, confirmée avec les premiers tests sérologiques effectués par la P.V.

● **Septoriose** : dominante dans l'Allier sur les F4 visibles. **Pas d'évolution actuellement sur les F3.**

- Info Présept -

Allier (Sologne, Bocage, Combrailles) :

■ Semis précoces (01 au 20 Oct.)

☞ Risques faibles à moyens, en baisse

Sud Allier (Val d'Allier) :

■ Semis tardifs (20 Oct. au 20 Nov.)

☞ Risques faibles à nuls

Puy-de-Dôme - Hte-Loire (Limagne) :

■ Semis fin Octobre

☞ Risques nuls

➔ **Estimer le risque Piétin de vos parcelles**

- secteurs favorables : Sologne, Val d'Allier sableux, Bocage, Combrailles.
- semis précoces
- précédents favorables (pailles)
- présence symptômes
- Kit Diagnolab (Test +)

Si risque : Intervenir entre le stade épi 1cm et 2 noeuds (cf dépliant «Fongicides 96-97»)

A base de :	Spécialités	Stade interven.
Prochloraze seul association	Sportak Sponsor Nordika, Troïka Epicure, Pyros,	épi 1cm à 1 noeud
Flusilazole	Capitan, Fennec, Panoply, Punch	
Epoxiconazole	Opus, Opus Team	
Bromuconazole	Granit, Fongral	
Cyprodinil	Unix	1 à 2 noeuds

ORGE d'Hiver

Stade : Redressement 4 à 5

Rhynchosporiose, Helminthosporiose, Oïdium, et localement Rouille naine sont en augmentation sensible avec montée sur F3.

➔ Intervenir dès le stade 1 noeud (6) avec un fongicide polyvalent (c.f. dépliant Fongicide Céréales 96-97)

TOURNESOL

● Mildiou

Pression en nette augmentation surtout dans l'Allier (Fortererre : Cindre, Rongères, Sanssat - Bocage : Souvigny...). La race A est la seule observée en Auvergne.

- ➔ choisir des semences traitées anti-mildiou
- ➔ ou semences officiellement résistantes
- ➔ prophylaxie : éliminer les repousses sur toute surface cultivée ou non.

● Phomopsis

Pression en augmentation, bien que dégâts limités (Ebreuil, Naves, Taxat-Senat, St Bonnet de Rochefort, Gannat (03) - St Genes du Retz, Aigueperse (63)) - c.f. bulletin du 18/10/95.

➔ Choisir les variétés les **moins sensibles** :

Grille CETIOM - Tolérance aux maladies

Variétés Très peu sensibles :

ALAMO, ANDORA, DK 3795, RIGASOL, AGRISOL, PISTOL, SANKARA, SANTIAGO, SELECT, AMELIA, ASTURIA, LABRADOR.

Variétés Peu sensibles :

JOHAN, SANTAFE, ALBENA, CLIOSOL, PRINCIL, JAGUAR, AUTAN, DK 3828, FANTASOL, CORISTE, NIVA, POLO, SUZANNA, APISOL...

Nouveaux Fongicides...

Visa CT ou Favori (Schering) : mélange de fluquinconazole et de chlorothalonil, autorisé sur Rouille brune, jaune, Septorioses du blé à 1,8 l/ha en préventif.